



静岡赤十字病院研究報
第26巻1号 平成18年12月1日発行

発行	静岡赤十字病院
	〒420-0853 静岡市葵区追手町8の2
	電話 (054) 254-4311
印刷	株式会社 静岡システムテクノロジー

Lulicon® Cream1%・Solution1%

指定医薬品
抗真菌剤

薬価基準収載

L U L I C O N

ルリコン®クリーム1% ルリコン®液1%

ルリコナゾール (Luliconazole) 製剤

白癬(足白癬、体部白癬、股部白癬)、
皮膚カンジダ症(指間びらん症、間擦疹)、
癬風に
新しいイミダゾール系外用抗真菌薬

【禁忌(次の患者には使用しないこと)】
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【効能・効果】

下記の皮膚真菌症の治療

白 癬：足白癬、体部白癬、股部白癬
カンジダ症：指間びらん症、間擦疹
癬 風

【用法・用量】

1日1回患部に塗布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

副作用等発現状況の概要

承認前の調査1,142例(クリーム1,035例、液107例)中、報告された副作用は2.5%(28例、36件)で、主な副作用はいずれも塗布部位の局所性のものであり、クリームではそう痒7例(0.7%)、発赤6例(0.6%)、刺激感、接触皮膚炎各5例(0.5%)、疼痛4例(0.4%)、湿疹2例(0.2%)など、液では刺激感、接触皮膚炎各1例(0.9%)であった。

下記のような症状があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

		0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明*
クリーム	皮 膚	そう痒、発赤、刺激感、接触皮膚炎、疼痛、湿疹	ほてり、熱感、灼熱感	水疱
	その他		BUN上昇、尿蛋白増加	
液	皮 膚	刺激感、接触皮膚炎		そう痒

*自発報告につき頻度不明

2. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。〔妊娠中の使用に関する安全性は確立していない。〕

3. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。〔使用経験がない。〕

4. 適用上の注意

使用部位：

- (1)眼科用として角膜、結膜には使用しないこと。
- (2)著しいびらん面には使用しないこと。
- (3)亀裂、びらん面には注意して使用すること。(液のみ)

5. その他の注意

- (1)アジュバントを用いて感受性を高めた動物実験(モルモット)において、本剤に皮膚感受性及び皮膚光感受性(液のみ)が認められている。
- (2)損傷皮膚を用いた動物実験(ラット、ODT条件)において、クリームに比較して液の経皮吸収性が高くなることが認められている。

○その他詳細については添付文書を参照してください。

製造販売元 ポーラ化成工業株式会社
神奈川県横浜市神奈川区高島台2-7-1

発売元 科薬株式会社
(資料製薬先) 東京都板橋区舟渡2丁目8番10号